СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

**БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ**

✉ **Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А**
☎ **+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg**

# З А П О В Е Д

**№** РД11-682

**София,** 22.04. **2016 г.**

На основание параграф 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията *(Обн. ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.),* във връзка с чл. 15 л, ал. 1 от Закона за защита на растенията (*отм.),* чл. 66 (1), чл.60 (1) и чл. 69 (1) от Закона за защита на растенията, чл. 43, чл.51 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), и Предложение с вх. № .....2016 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със заявление с вх. № 17378/08.10.2014г. на фирма ДюПон България ЕООД

**Н А Р Е Ж Д А М:**

I. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: КОРАГЕН 20 СК

Активно вещество: хлорантранилипрол – 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита – ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Производител на активното вещество хлорантранилипрол – ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: непрофесионална
Размер и материал на опаковката: 50мл, 100 мл, 150мл, 200 мл, 250мл, 300мл, 500мл, 1л бутилка, HDPE

**Забележки:**

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми при семкови овощни видове.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м в комбинация с растителнозащитна ивица от 10м до повърхностни води с цел опазване на водните организми при костилкови овощни видове.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми при лозя.

# Таблица за разрешените употреби №1

| Име на продукта | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Формулация | | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | Конц. на а.в. (i) | Тип (d-f) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал между Приложен. | г/мл продукт /дка Мин//макс | Вода L/дка Мин// макс | гр. а.в./дка | (l) | (m) |
| КОРАГЕН 20СК | Ябълки, круши | П | Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella);* Листоминиращи молци *(Leafminers);* Листозавивачки *(Tortricidae);* Източен плодов червей *(Cydia molesta)* | 200 г/л | СК | Конвенционална наземна техника | BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване - беритбена зрялост | 2 | 12 дни | 16 – 30 мл/дка (16-20 mL/hL) | 70-150 л/дка | 0,32 – 0,4 g/hL | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Праскови, нектарини, кайсии | П | Източен плодов червей *(Cydia molesta);* Прасковен клонков молец *(Anarsia lineatella)* | 200 г/л | СК | Конвенционална наземна техника | BBCH 15-49 | 2 | 10 дни | 16 – 30 мл/дка (16-20 mL/hL) | 70-150 л/дка | 0,32 – 0,4 g/hL | 14 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРАГЕН 20СК | Сливи | П | Сливов плодов червей *(Cydia funebrana);* Малка зимна педомерка *(Opherophtera brumata)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 16 – 30 мл/ дка (16-20 mL/hL) | 70-150 л/дка | 0, 32 – 0,4 g/hL | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Орехи | П | Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL) | 100-150 л/дка | 0,36 – 0,40 g/hL | 21 | |
| КОРАГЕН 20СК | Кестени | П | Плодови червеи *(Cydia pomonella, Cydia fagiglandana);* Кестенов хоботник *(Curculio elephas)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 18 – 30 мл/дка (18-20 mL/hL) | 100-150 л/дка | 0,36 – 0,4 g/hL | 21 | |
| КОРАГЕН 20СК | Бадеми | П | Прасковен молец *(Anarsia lineatella)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 18 – 30 мл/ дка (18-20 mL/hL) | 100-150 л/дка | 0,36 – 0,4 g/hL | 21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРАГЕН 20СК | Лозя (винени и десертни сортове) | П | Гроздови молци *(L. botrana, E. ambiguella)* Малка лозова листозавивачка *(Argyrotoenia pulchellana)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | ВВСН 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-зърната формират цвят | 1 | | 15 –27 мл/ дка (15-18 mL/hL) | 50-150 л/дка | 0,30-0,36 g/hL | 30 | |
| КОРАГЕН 20СК | Лозя (десертни сортове) | П | Гроздови молци *(L. botrana, E. ambiguella)* Малка лозова листозавивачка *(Argyrotoenia pulchellana)* | | | Конвенционал на наземна техника | ВВСН 57-85 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване н зърната | 2 | 10 | 15 –21,6 мл/ дка (15-18 mL/hL) | 50-120 л/дка | 0.3-0.36 g/hL | 3 | |
| КОРАГЕН 20СК | Царевица и сладка царевица | П | Царевичен стъблен пробивач *(Ostrinia nubilalis);* *Sesamia spp.* Нощенки *(H. armigera, S. exigua)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | 1)ВВСН14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря 2)ВВСН73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост | 2 | Мин.10 дни | 10 – 15 мл/ дка | 30-80 л/дка | 2-3г/дка | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРАГЕН 20СК | Картофи | П | Картофен молец *(Phthorimaea operculella)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 31-93<br>Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират - повечето от листата са пожълтели | 2 | 8 дни | 12,5-17,5 мл/дка | 30-80 л/дка | 2.5-3.5 г а.в. / дка | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Картофи | П | Колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)* | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 31-69<br>От: Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират - край на цъфтежа на първото съцветие | 2 | 14 дни | 5-6 мл/дка | 30-80 л/дка | 1-1.2 г а.в. / дка | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Лешник | П | Лешников хоботник (*Curculio nucum*) | 200 г/л | СК | Конвенционал на наземна техника | BBCH 73-87<br>Вторично окапване на завръза - беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 18 – 30 мл/дка<br>(18-20 mL/hL) | 100-150 л/дка | 0,36 – 0,4 g/hL | 21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРАГЕН 20СК | Домати, патладжан | П | Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*) Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*) Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*) Гамозначна нощенка (*Autographa gamma*) | 200 г/л | СК | Конвенционална наземна техника | BBCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер - пълна зрялост | 2 | 7 дни | 14-20 мл/дка (14-20 mL/hL) | 30-80 л/дка | 2,8-4 г а.в. / дка | 1 | |

## Таблица за разрешени минимални употреби №2

| Име на продукта | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Формулация | | Приложение | | | | Норма на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | Конц. на а.в. (i) | Тип (d-f) | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин// макс (k) | Интервал между Приложен. | г/мл продукт /дка Мин//макс | Вода L/дка Мин// макс | гр. а.в./дка | (l) | (m) |
| КОРАГЕН 20СК | Ябълки, круши | П | Петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване - беритбена зрялост | 2 | 12 дни | 16 – 30 мл/дка (16-20 mL/HL) | 70-150 л/дка | 0,0032 – 0,0400 g/hL | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Праскови, кайсии, нектарини | П | Петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 15-49 | 2 | 10 дни | 16 – 30 мл/дка (16-20 mL/hL) | 70-150 л/дка | 0,0032 – 0,0040 g/hL | 14 | |
| КОРАГЕН 20СК | Сливи | П | Петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост | 2 | 10 дни | 16 – 30 мл/ дка (16-20 mL/hL) | 70-150 л/дка | 0,0032 – 0,0040 g/hL | 14 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРАГЕН 20СК | Лозя (винени сортове) | П | Петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени - зърната формират цвят | 1 | - | 15 –27 мл/ дка (15-18 mL/hL) | 50-150 л/дка | 0,0030-0,0036 g/hL | 30 | |
| КОРАГЕН 20СК | Лозя (десертни сортове) | П | Петнистокрила дрозофила *(Drosophila suzukii)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 57- 85 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени - омекване н зърната | 2 | 10 | 15 –21,6 мл/ дка (15-18 mL/hL) | 50-120 л/дка | 0.3-0.36 g/hL | 3 | |
| КОРАГЕН 20СК | Домати | П | Доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* | 200 г/л | СЛ | Конвенционална наземна техника | BBCH 71–89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост | 2 | 7 | 14 –20 мл/ дка | 30-80 л/дка | 2,8-4,0 г/дка | 1 | |

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*

| **Класификация** | | | **Етикетиране** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Клас и категория на опасност** | **Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност** | **Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)** | **Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност** | **Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност** | **Специфични предпазни мерки за безопасност** |
| Опасност за водната среда – остра, категория 1<br>Опасност за водната среда – хронична, категория 1 | H400<br>H410 | GHS09<br>Внимание | H410 | EUH401<br>EUH208<br>Съдържа 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2*H* -изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция | SP фрази<br>SP1, SPe 3 |

II. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или за проявена фитотоксичност от използването на продукт за растителна защита КОРАГЕН 20СК за разрешените в таблица №2 минимални употреби. Отговорността за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност е на лицето, което употребява продукта.

III. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година от датата, на която изтича одобрението на активното вещество хлорантранилипрол, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.04.2024 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

IV. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК, притежаващ Удостоверение № 01126- ПРЗ - 2/29.01.2014 г. за пускане на пазара и употреба на заместник изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, издадено на основание Заповед № РД 11 – 364/ 09.05.2011 г и Заповед № РД 11-118/29.01.2014 г. на изпълнителни директор на Българска агенция по безопасност на храните.

V. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ДюПон България ЕООД.

VI. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява. Разширението за минимална употреба съгласно таблица №2 да се обозначи отделно на етикета.

VII. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**