СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ РД 11-458

София, 28.03 **2014 г.**

На основание чл. 15л и чл 15е от Закона за защита на растенията, чл. 30-37 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 4890/11.03.2014 г. председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 07-00-283/03.05.2007г. и вх. № 3158/17.02.2014 г. на „КиН Ефтимиадис България" ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Подновяване на разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК / ЦАЙПЕР 10 ЕК

циперметрин – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита – КиН Ефтимиадис Гърция

Производител на активното вещество циперметрин – СБМ Девелопмънт

Употреба:

- Срещу листни въшки по листата и класа при житни култури – пшеница, ръж и тритикале, в доза 25 мл/дка (0,25 л/ха);
- Срещу рапичен цветояд при рапица, в доза 15 мл/дка (0,15 л/ха);
- Срещу лозова листозавивачка, в доза 50 мл/дка (0,50 л/ха) и шарен гроздов молец, в доза 40 мл/дка (0,4 л/ха) при лозя;
- Срещу колорадски бръмбар при картофи, в доза 20 мл/дка (0,2 л/ха);
- Срещу миниращ молец и ябълков плодов червей при ябълки, в доза 30 мл/дка (0,3 л/ха);

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат - ЕК

Техника на приложение:

- Механизирано прилагане с тракторна щангова пръскачка
- Механизирано прилагане с тракторна вентилаторна пръскачка

Момент на приложение: листно приложение при поява на неприятеля;

- при житни: срещу листни въшки по класа във фенофаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 на есен

Максимален брой приложения: 2

Интервал между третиранията: 21 дни

Количество работен разтвор:

- Житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 20-25 л/дка
- Рапица -15 л/дка
- Лозя –30 л/дка
- Картофи –20 л/дка
- Ябълки – 50л/дка

Карантинен срок:

- Житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 21 дни
- Рапица – 7 дни
- Лозя – 7 дни
- Картофи – 7 дни
- Ябълки – 14 дни

Размер и материал на опаковката:

0,10 л, 0,25 л, 1 л и 5 л

Материал: COEX HDPE/PA – високоплътен полиетилен с вътрешен слой полиамид

Срок на годност: 2 години

Символи и знаци за опасност:

Класификация и етикетиране съгласно Директива 99/45/ЕС:

Xn - Вреден

N- Опасен за околната среда

R фрази: R22, R37, R38, R41, R50/53, R65, R67

S фрази: S2, S20/21, S26, S35, S36/37/39, S57, S 62, S 65

SP фрази: SP 1

SPe фрази: SPe 3, SPe 8

Класификация и етикетиране съгласно Регламент 1272/2008:

Предупреждение за опасност: H302, H315, H318, H304, H335, H336, H 400, H 410

Кодове на пиктограмата и на сигналната дума: GSH09, Внимание;

Кодове на допълнително предупреждение за опасност:

EUH401

Забележка:

- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м с класическа техника за разпръскване или 10 м в съчетание с дюзи намаляващи отвяването на пръскан продукт с 50 % до неземеделски земи и повърхностни водни обекти с цел опазване на водните организми за употреби при полски култури при дози на приложение 2 x15гр а.в./ха; 2x20 гр, а.в./ха; 2x25 гр. а.в./ха; 2x30 гр а.в./ха.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 50 метра с класическа техника или 20 м с техника намаляваща отвяването със 75% до повърхностни водни обекти с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране при грозде (късно) и ябълки.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на нецелеви членестоноги, които не са обект на третиране при зърнени култури, грозде и картофи
- Опасен за пчели. Да не се прилага при култури в периода на цъфтежа с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. Да се пръска след 18.00 часа.
- В двугодишен срок след издаване на разрешението за пускане на пазара, трябва да се представят 2 изпитвания върху картофи, проведени в южна европейска зона.

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до 28.02.2017 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на „КиН Ефтимиадис България" ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: ...
Заповед за заместване № РД 11-421
от 27.03.2014 г.

МС/РЗК/БАБХ