ПРОПЛАНТ® 722 СЛ

ФУНГИЦИД

Сигнална дума: Внимание



РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H317 - Може да причини алергична кожна реакция
EUH208 - Съдържа пропамокарб хидрохлорид. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P261 - Избягвайте вдишване на изпарения
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/ защитни очила
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби

Допълнително етикетиране:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

BG-PRP-092-03 (1020)

Системен фунгицид за контрол на почвени патогени - *Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.*

Функция: Проплант 722 СЛ е системен фунгицид, за контрол на почвени патогени - *Pythium spp. u Phytophthora spp.*, причиняващи сечене на разсада, а също така и за различни видове мани *(Perenospora parasitica, Bremia lactucae, Pseudoperono spora cubensis)*. Прилага се при домати, пипер, праз, лук, чесън, зеле, краставици, корнишони, тиквички, ряпа, репички, целина (стрък), марули, пъпеш, луковични и декоративни растения, както и за общо третиране на почвата против сечене на разсада.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :
Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26, BTE 1, 4102 Ougree, Belgium

РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В Р БЪЛГАРИЯ: Разрешение № 01105-ПРЗ-5/04.09.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, Заповед № РД 11-1569/07.07.2020 г. и Заповед № РД 11-1990/27.08.2020 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Пропамокарб хидрохлорид 722 г/л

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО (IUPAC):
Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:
Карбамати и тиокарбамати

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: разтворим концентрат (СЛ)

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 2 години.
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

Дата на производство/ Партиден номер: виж печата на бутилката

200 л

UPL








ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба !

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА: Проплант 722 СЛ е одобрен в Р България срещу:

КУЛТУРА	БОЛЕСТ	МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ	БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ	ДОЗА	ВОДА	КАРАНТИНЕН СРОК
Домати и пипер (оранжерийно производство)	Почвени патогени (*Pythium* spp., (*Phytophtora* spp.)	Поливане на разсада BBCH 00-10 (сухи семена – пълно разтваряне на котиледоните) Конвенционална наземна техника, вкл. системи за капково напояване	2	За домати по 5 мл/м^2 (1-во и 2-ро приложение) За пипер: 1-во приложение: 5 мл/м^2 2-ро приложение: 2,5 мл/м^2	5 л/м^2	-
Праз, Лук, Чесън, Зеле, Краставици, Корнишони, Тиквички, Ряпа, Репички, Целина – стрък (оранжерийно производство)	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада (*Phytophthora spp., Phytium spp.*)	При сеитба или при разсаждане Третиране на почвата BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	10 мл/м^2	10 л/м^2	90 дни
Зеле – третиране на почвата (оранжерийно производство)	Мана (*Perenospora parasitica*)	При сеитба или при разсаждане Поливане/ Третиране на почвата	2	10 мл/м^2	10 л/м^2	90 дни
Зеле – третиране на почвата (оранжерийно производство)	Мана (*Perenospora parasitica*)	Поливане/ третиране на почвата BBCH 09-19 (поникване: котиледоните пробиват повърхността на почвата-9 или повече същински листа разтворени)	2	250 мл/дка	100 л/дка	90 дни
Марули (полско производство)	Мана (*Bremia lactucae*)	BBCH 13-19 (разтворен трети същински лист - 9 или повече същински листа разтворени)	2	150 мл/дка	100 л/дка	14 дни
Марули (оранжерийно производство)	Мана (*Bremia lactucae*)	BBCH 13-19 (разтворен трети същински лист - 9 или повече същински листа разтворени)	3	150 мл/дка	100 л/дка	21 дни
Краставици (полско и оранжерийно производство)	Мана (*Pseudoperono spora cubensis*)	BBCH15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен- пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	300 мл/дка	100 л/дка	3 дни
Пъпеши (полско производство)	Мана (*Pseudoperono spora cubensis*)	BBCH 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	300 мл/дка	100 л/дка	3 дни
Луковични и декоративни растения* (оранжерийно производство)	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада (*Phytophthora spp., Phytium spp.*)	При сеитба или при разсаждане BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	10 мл/м^2	10 л/м^2	
Общо третиране на почвата против сечене на разсада** (оранжерийно производство)	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада (*Phytophthora spp., Phytium spp.*)	При сеитба или при разсаждане BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	10 мл/м^2	10 л/м^2	90 дни

* Луковични и декоративни растения: **Aracae**: *Epipremnum pinnatum, Diffenbachia sp, Xanthosoma robustum*; **Asteracae**: *Dendranthema-Grandiflorum* (хризантема), *Chrysanthemum indicum, Gerbera sp., Aster sp.*; **Crassulacae**: *Kalanchloe blossfeldiana*; **Cupressacae**: *Chamaecyparis lawsoniana*; **Ericacae**: *Rhododendron simsii* 'Ostalett' (Azalee), *Rhododendron simsii* (Azalee), *Erica gracilis*; **Euphorbiacae**: *Euphorbia pulcherrima, Poinsettia sp*; **Geraniacae**: *Pelargonium zonale*; **Iridacae**: ириси; **Lamiacae**: *Antirrhinum majus, Anthirrhinum majus*; **Liliacae**: лалета, **Ranunculacae**: лютиче; **Violacae**: *Saintpaulia ionantha*

** Употребата общо третиране на почвата срещу сечене на разсада е допустима при оранжерийни условия при по-горе посочените култури, както и при култури представители на ботаническите семейства, при които ефикасността и селективността на ПРЗ Проплант 722 СЛ е изпитана. Не знам, при кои е изпитана ефикасността и селективността. Това е в заповедта и разрешението. Може да предложите друг текст.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ БРОЯ ПРИЛОЖЕНИЯ:
☐ Първо приложение до 7 дни
☐ Второ приложение 7-10 дни след първото

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Необходимото количество от ПРОПЛАНТ 722 СЛ се излива в наполовина пълен резервоар. След това резервоара се долива до горе с вода, като сместа се разбърква внимателно и да се хомогенизира. Да се поддържа умерено разбъркване на разтвора по време на употреба. Разтворът трябва да се използва в деня на приготвянето му.
ПРОПЛАНТ 722 СЛ е корозивен продукт. Металните части на пръскачката да се измият с вода веднага след употреба.

Механизъм на действие: Проплант 722 СЛ се поема от корените и се транслоцира по цялото растение до надземните части. Има и системно действие, когато се поема от листата. Контролира щамовете на гъби от клас Фикомицети, резистентни към използваните ацилаланинови фунгициди, тъй като има различен начин на действие в сравнение с тях. Продукта има последействие 8 седмици.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Продуктът се прилага чрез поливане или преовлажняване на почвата, като разтвор от 0.1% до 0.3% при листно третиране, според таблицата по-горе, и преди употреба, трябва да бъде разтворен в препоръчаното количество вода (виж таблицата) в резервоара на оборудването за третиране.

СМЕСИМОСТ: Ако е необходимо смесване, преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни само за тютюн

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
Да не се прилага при горещо и сухо време.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална

ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.
- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

СЛЕД РАБОТА: основно измиване с вода и сапун и изпиране на работното облекло.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
При неразположение да се направи консултация с лекар и при възможност да му се покаже етикета.
При вдишване: Може да предизвика кашлица и затруднено дишане. Пострадалият да се изнесе на чист въздух. Да се потърси лекарска помощ, ако има затруднено дишане.
Контакт с кожата: Не е необходима първа помощ.
Контакт с очите:Дразни очите - обилно да се изплакнат с течаща вода в продължение на 15 минути.
Поглъщане: Да се изплакне устата. Когато пострадалият е в безсъзнание, незабавно да се потърси лекарска помощ.

ПОЛЕЗНИ ЗА ЛЕКАРЯ УКАЗАНИЯ:
Антидот: Атропин (при симптоми свързани с нервната система).
При необходимост се свържете с Национален Информационен Токсикологичен Център **УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"**
Тел. +359 2 9154 409 ;
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg

Токсичност: ЛД50 > 2000 мг/кг орално за плъх
Екотоксичност: Не е токсичен за пчелите. Токсичен за рибите.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА:
Не се допуска изхвърляне на продукта в канали и други водоизточници. Да се покрие излятия продукт с адсорбиращ материал, след което да се постави в затворени съдове и да се потърси съдействие на специалист.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: Невъзпламеним. При общ пожар може да отделя токсични газове – да се носи подходящ дихателен апарат. Да се гаси с вода, пяна или въглероден диоксид. Неподходящи средства за гасене : Силна струя вода. При изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
След употреба опаковката да се изплакне трикратно. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ:
ЮПЛ България ЕООД;
1303 София, ул.Чипровци № 12,
тел. (02) 943 47 61,
www.arystalifescience.bg; www.upl-ltd.com

ССОП