РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1990

София, 17.08 2020 г.

На основание чл. 68, ал.1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, във връзка с чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2442/29.07.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10002/17.06.2016 г. на фирма Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01105 - ПРЗ - Издание 4/10.07.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита **ПРОПЛАНТ 722 СЛ**, както следва:

   1.1. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменят с Приложение № 1 от настоящата заповед.

   1.2. На стр. 4 се добавят следните специфични изисквания за употреба:

      1.2.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване и зареждане на продукта при употреба чрез ръчна пръскачка при краставици и пъпеши в доза 300 мл/дка на полето и в оранжерии.

      1.2.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води при всички култури, отглеждани на поле с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране.

2. Съгласно чл. 69 ал.1 от Закона за защита на растенията, считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **ПРОПЛАНТ 722 СЛ**, етикетиран в съответствие с Разрешение № 01105-ПРЗ- Издание 4/10.07.2020 г.

3. На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия.
4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОМ/ПРЗТК /БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД-1199/27.08.20

Търговско наименование на продукта: **ПРОПЛАНТ 722 СЛ**

Формулация: разтворим концентрат (**СЛ**)

Концентрация на активно вещество: **пропамокарб** (под формата на пропамокарб-хидрохлорид) - 722 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож (мин-макс)	мл продукт /кв.м Мин/ макс	Вода л/дка	г а.в./ кв.м	(l)	(m)
1.	Домати	О	Почвени патогени (*Phytophthora sp Pythium sp.)*	Поливане на разсада Конвенционална наземна техника вкл. Система за капково напояване	BBCH 00-10 (сухи семена – пълно разтваряне на котиледоните)	2 (първо приложение до 7 дни след засяване, второ приложение – 7-10 дни след първото)	7-10 дни	5 мл продукт/$м^2$	5 л/$м^2$	3,61 г а.в./$м^2$		Прилага се като 0,1 % разтвор Общото количество пропамокарб-хидрохлорид не трябва да надвишава 7,22 г а.в./м2
2.	Пипер	О	Почвени патогени (*Phytophthora sp Pythium sp.)*	Поливане на разсада Конвенционална наземна техника вкл. Система за капково напояване	BBCH 00-10 (сухи семена – пълно разтваряне на котиледоните)	2 (първо приложение до 7 дни след засяване, второ приложение – 7-10 дни след първото)	7-10 дни	I-во приложение 5 мл продукт/$м^2$ II -во приложение 2,5 мл продукт/$м^2$	5 л/$м^2$	3,61 г а.в./$м^2$		Прилага се като 0,1 % разтвор

3.	Праз, Лук, Чесън, Зеле, Краставици, Корнишони, Тиквички, Ряпа, Репички, Целина – стрък	О	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада *(Phytophthora spp., Phytiumspp.)*	Конвенционална наземна техника Третиране на почвата	При сеитба или при разсаждане BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	7-10	10 мл продукт/м^2	10 л/м^2	7.22 г а.в./м^2	90 дни	
4.	Зеле – третиране на почвата	О	Мана *(Perenospora parasitica)*	Конвенционална наземна техника поливане/третира не на почвата	При сеитба или при разсаждане	2	7-10	10 мл продукт/м^2	10 л/м^2	7.22 г а..в./м^2	90 дни	
5.	Зеле – третиране на почвата	О	Мана *(Perenospora parasitica)*	Конвенционална наземна техника поливане/третира не на почвата	BBCH 09-19 (поникване: котиледоните пробиват повърхността на почвата-9 или повече същински листа разтворени)	2	7-10	250 мл продукт/дка	100 л/дка	180.5 г а.в./дка	90 дни	
6.	Марули	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински листа разтворени)	2	7-10	150 мл продукт/дка	100 л/дка	108.3 г а.в./дка	14 дни	
7.	Марули	О	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински листа разтворени)	3	7-10	150 мл продукт/дка	100 л/дка	108.3 г а.в./дка	21 дни	

8.	Краставици	П/О	Мана (*Pseudoperonospora cubensis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	300 мл продукт/дка	100 л/дка	216.6 г а.в./дка	3 дни	
9.	Пъпеши	П	Мана (*Pseudoperonospora cubensis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	300 мл продукт/дка	100 л/дка	216.6 г а.в/дка	3 дни	
10.	Общо третиране на почвата против сечене на разсада**	О	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада (*Phytiumspp., Phytophtora spp*)	Конвенционална наземна техника	При сеитба или при разсаждане BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	7-10	10 мл продукт/$м^2$	10 л/$м^2$	7.22 г а.в./$м^2$	90 дни	

11.	**Луковични и декоративни растения***	О	Почвени патогени причиняващи сечене на разсада *(Phytophthora spp., Phytiumspp.)*	Конвенционална наземна техника Третиране на почвата	при сеитба или при разсаждане BBCH 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) BBCH 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)	2	7-10	10 мл продукт/м^2	10 л/м^2	7.22 г а.в./м^2	90 дни	

*Луковични и декоративни растения:**Araceae**: *Epipremnum pinnatum*, *Diffenbachia sp*, *Xanthosoma robustum;***Asteraceae**: *Dendranthema-Grandiflorum* (хризантема), *Chrysanthemum indicum*, *Gerbera sp.*, Aster sp.; **Crassulacae**: *Kalanchloe blossfeldiana;***Cupressacae**: *Chamaecyparis lawsoniana*; **Ericacae**: *Rhododendron simsii* 'Ostalett' (Azalee), *Rhododendron simsii* (Azalee), *Erica gracilis*; **Euphorbiacae**: *Euphorbia pulcherrima*, *Poinsettia sp*; **Geraniacae**: *Pelargonium zonale*; **Iridacae**: ириси; **Lamiacae**: *Antirrhinum majus*, *Anthirrhinum majus*; **Liliacae**: лалета,**Ranunculacae**: лютиче; **Violacae**: *Saintpaulia ionantha*

**Заявената употреба за общо третиране на почвата срещу сечене на разсада е допустима при оранжерийни условия при по-горе посочените култури, както и при култури представители на ботаническите семейства при които ефикасността и селективността на ПРЗ Проплант 722 СЛ е изпитана

Забележка:

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ПИВ/, включително където е уместно, информация за сезона на приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.