РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ ...РД 11-1041...

София, ...03.06..... 2019 г.

На основание чл. 68, ал. 1; чл. 69, ал. 1 и ал. 3; параграф 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията; чл. 45, чл. 46 и чл. 80 от преходни и заключителни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1854/09.05.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 9921/27.10.2011 г. и Заявление с вх. № 16953/18.12.2017 г. на *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СКОР 250 ЕК**

Активно вещество: дифеноконазол 250 г/л (кандидат за замяна)

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество дифеноконазол: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 750 мл, и 1л в бутилки от HDPE, HDPE-PA, f-HDPE; 2 л, 5 л, 10 л, 20 л в бидони от HDPE, HDPE-PA, f-HDPE.

2. Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра буферна зона за ягоди и къпини, 25 метра буферна зона за костилкови / семкови култури (ранно приложение), 15 метра буферна зона за костилкови / семкови култури (късно приложение), 3 метра буферна зона с включени 75% дюзи намаляващи отвяването за кореноплодни зеленчуци (без картофи), 5 метра буферна зона с включени 50% дюзи намаляващи отвяването за картофи, 3 метра буферна зона с включени 50% дюзи намаляващи отвяването за листни зеленчуци, 20 метра буферна зона за маслини, 10 метра буферна зона за лозя до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество дифеноконазол съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) 1107/2009 г. и Регламент (ЕС) № 2018/1796 от 20 ноември 2018 г., а именно до 31.12.2020 г.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита СКОР 250 ЕК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита СКОР 250 ЕК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващите наличности от продукта за растителна защита СКОР 250 ЕК, етикетирани в съответствие с Удостоверение № 01041-ПРЗ, издание 2/11.05.2012 г.
9. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.
10. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ
(Съгласно Заповед № РД 11-1846 / 14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1041/03.06.2019г.

Търговско наименование на продукта: Скор 250 ЕК
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: дифеноконазол (250 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	мл продукт /дка мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Ябълки	П	Струпясване (*Venturia inaequalis*); брашнеста мана (*Podosphaera leucotricha*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете отворени-начало на узряване: поява на специфичното за сорта оцветяване)	3	10	0,015-0,02% (15-20 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150 л/дка	3,75-5,0 г а.в./дка	14	Да се спазва Законът за пчеларството.
2	Круши	П	Струпясване *(Venturia pirina)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете са отворени-начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)	3	10	0,015-0,02% (15-20 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150 л/дка	3,75-5,0 г а.в./дка	14	Да се спазва Законът за пчеларството.

3	Праскови	П	Къдравост (*Taphrina deformans*), брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa v. persicae*) кафяво гниене (*Monilia* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок	2	7 -14	0,02-0,03% (20-30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150 л/дка	5,0-7,5 а.в./дка	7	Да се спазва законът за пчеларството.
4	Нектарини	П	Къдравост (*Taphrina deformans*), брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa v. persicae*) кафяво гниене (*Monilia* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 60 (първи отворени цветове) до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок	2	7 -14	0,02-0,03% (20-30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150	5,0-7,5	7	Да се спазва законът за пчеларството.
5	Череши	П	Бяла ръжда (цилиндроспориоза) (*Blumeriella jaapii*, syn. *Coccomices hiemalis*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-77 (разрастване на яйчника, окапване на завързи след цъфтежа-плодовете са достигнали около 70% от окончателната си големина)	3	8-10	0,03% (30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150	7,5	7	Да се спазва Законът за пчеларството.

6	Череши, сливи	П	Къдравост (*Taphrina deformans*), брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa v. persicae*), кафяво гниене (*Monilia* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 60-87 (първи отворени цветове-беритбена зрялост)	3	10	0,02-0,03% (20-30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150 л/дка	5,0-7,5 а.в./дка	7	Да се спазва законът за пчеларството.
7	Домати	П/О	Кафяви петна (алтернариоза) (*Alternaria porri f.sp. solani*); брашнеста мана (*Leveillula taurica*) листна плесен (*Cladosporium* sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло-70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	3	7	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	поле-7; оранжерии-3	
8	Захарно цвекло	П	Церкоспороза (*Cercospora beticola*); брашнеста мана (*Erysiphe betae*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	0.03% (30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	7,5	21	

9	Картофи	П	Кафяви петна (алтернариоза) (*Alternaria* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40-85 (начало на образуване на клубени-плодовете от 1-во плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)	3	7	0.06% (60 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	15,0 а.в./дка	3	
10	Маслини	П	Листни петна (*Cycloconium* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 75-85 (размер на плода около 50% от типичния за сорта-увеличаване на специфичното за сорта оцветяване)	2	14	40-50 мл/дка	80	10,0-12,5	30	
11	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe necator*); Черно гниене (*Guigardia bidwellii*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-85 (вторите листа са отворени-омекване на зърната)	4	10	0.012-0,02% (12-20 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100	3,0-5,0	21	
12	Ягоди	О	Брашнеста мана (*Podosphaera macularis)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 65-89 (пълен цъфтеж: отворени вторични и третични цветове-втора реколта:повечето плодове са оцветени)	3	7	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	3	
13	Краставици, тиквички, пъпеши, дини	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	3	8	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	3	

14	Краставици, тиквички, пъпеши, дини	О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-89 (поява на 1-во странично разклонение-пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	8	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	12,5 а.в./дка	3	
15	Главесто зеле, карфиол	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)	3	10	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	21-главесто зеле, 14-карфиол	

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №.РД 11-1041/03.06.2019г.

Търговско наименование на продукта: Скор 250 ЕК
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: дифеноконазол (250 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин// макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	мл продукт /дка мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
16	Мушмули, дюли	П	Струпясване (*Venturia pirina*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-84 (начало на цъфтеж:около 10% от цветовете са отворени-начало на узряване)	3	10	0,015-0,03% (15-30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	100-150	3,75-7,5	14	

17	Малини, къпини	О	Брашнеста мана (*Podosphaera* spp.); антракноза (*Drepanopeziza* spp.); дидимела (*Didymella* sp.), ръжда (*Phragmidium* sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-49 (леторастите достигат 10% от окончателната си дължина (25 см)-видими първи цветни пъпки)	2	7	0,03-0,04% (30-40 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	7,5-10,0 а.в./дка	7	
18	Броколи	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.); брашнеста мана (*Erysiphe* sp., *Leveillula* sp.); аскохитоза (*Mycosphaerella brassicicola*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40-46 (главите на броколи започват формиране;ширина на нарастващия връх > 1см-60% от очаквания диаметър е достигнат)	3	10	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	14	
19	Артишок	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.); брашнеста мана (*Erysiphe* sp., *Leveillula* sp.); аскохитоза (*Mycosphaerella brassicicola*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40-46 (образувана от 10% до 60% от листната маса, характерна за вариетета)	3	7	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	14	

20	Магданоз	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.); брашнеста мана (*Erysiphe heraclei*, *Erysiphe cichoracearum*), септориоза (*Septoria* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40 (корените започват да нарастват (диаметър>0,5 см))	2	14	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	12,5 а.в./дка	14	
21	Магданоз	О	Алтернариоза (*Alternaria* spp.);брашнеста мана (*Erysiphe heraclei*, *Erysiphe cichoracearum*), септориоза (*Septoria* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40 (корените започват да нарастват (диаметър>0,5 см))	3	14	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	14	
22	Кромид лук, чеснов лук	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.); ръжда (*Puccinia allii)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват или удължават-листата са загинали)	2	12	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	14	
23	Праз лук	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.); ръжда (*Puccinia allii)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват или удължават-листата са загинали)	3	12	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	21	

24	Аспержи	П	Ръжда по лук (*Puccinia allii*); стемфилиум (*Stemphylium* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-89	3	14	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	12,5 а.в./дка	-	
25	Целина	П	Септориоза (*Septoria* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (корените започват да нарастват-край на нарастването на корена)	3	14	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	14	
26	Сладки картофи (батати)	П	Алтернариоза (*Alternaria* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-85 (корените започват да нарастват-50% от плодовете узрели или 50% от семената са с типичен цвят,сухи и твърди)	3	7	0,06% (60 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	15,0	3	
27	Захарно цвекло	П	Рамулариоза (*Ramularia beticola*), ръжда (*Uromices betae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 31-49 (листата покриват 10% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	0,03% (30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	7,5	21	

28	Червено и други видове цвекло	П	Церкоспороза (*Cercospora beticola*); брашнеста мана (*Cercospora beticola*), рамулариоза (*Ramularia beticola*)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	0,03% (30 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	7,5 а.в./дка	21	
29	Бобови култури (фасул,леща, нахут, лупина)	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi*), *Mycosphaerella* spp.	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждат-чушки:отделни фасулеви зърна се виждат лесно)	2	21	0.04% (40 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	40-50	10,0	28	
30	Главесто зеле, карфиол	П	Аскохитоза (*Mycosphaerella* spp.)	Конвенционал на наземна техника	ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)	3	10	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100	12,5	21-главесто зеле, 14-карфиол	

31	Декоративни растения и цветя	П/О	Листни петна (алтернариоза) (Alternaria spp.), кафяви листни петна (церкоспороза) (Cercospora spp.), антракноза (Colletotrichum spp.), брашнеста мана (Erysiphe spp.), ръжди (Uromyces spp., Puccinia spp., Phragmidium spp.), кафяви петна по далията (Phyllosticta spp.), рамулариоза (Ramularia spp.), септориоза (Septoria spp.), стемфилиум (Stemphylium spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-89	3	14	0,05% (50 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	50-100 л/дка	12,5 а.в./дка	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита СКОР 250 ЕК за разрешените минимални употреби в Приложение № 2 от настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на СКОР 250 ЕК за разрешените минимални употреби в Приложение № 2 от настоящата заповед, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете): където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1041 / 13.06.2019

Търговско наименование на продукта: Скор 250 ЕК
Формулация:емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: дифеноконазол (250 г/л)

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Очно дразнене, категория 2 Опасност при вдишване, категория 1 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H319 H304 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H319 H304 H410	EUH066 EUH401	SP1 SPe3