РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РРП-2061

София, ...19.10..... **2018 г.**

На основание чл. 68, ал. 1, чл. 69, ал. 1 и ал. 3, параграф 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 45, чл. 46 и чл. 80, т. 5, буква „б" от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3799/02.10.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № 07-00-933/23.12.2009 г., с вх. № 4501/15.03.2016 г, с вх. № 10783/15.08.2017 г. на фирма „Синджента България" ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Подновявам разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ТОПАЗ 100 ЕК**

Активни вещества : пенконазол – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария//SyngentaCrop Protection AG, Switzerland
Производител на активното вещество пенконазол: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария//SyngentaCrop Protection AG, Switzerland
Функция на продукта за растителна защита: Фунгицид
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба: непрофесионална
Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл. и 1 л – бутилка, HDPE

1. **Специфични изисквания за употреба:**
   - 1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища;
   - 1.2 При смесване, зареждане и прилагане на продукта да се използват непропускащи ръкавици и маска за очите/лицето;
   - 1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води,с цел опазване на водните организми- при костилкови овощни видове.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на

която изтича одобрението на активното вещество пенконазол съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, а именно до 31.12.2022 г.

5. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита **ТОПАЗ 100 ЕК с Удостоверение № 01043-ПРЗ-1/21.02.2010 г.**
6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България" ЕООД.
7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 /14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ПГ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РР11-2061/19.12.11

Търговско наименование на продукта: Топаз 100 ЕК
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активните вещества: пенконазол - 100 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между прилож (мин)	мл продукт /дка Мин//макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Костилкови овощни видове (праскова)	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)	Конвенционалназемна техника	BBCH 71-79 (разрастване на яйчника;окапване на завързи след цъфтежа-плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)	2	12-14	50 мл/100 л работен разтвор	80-150	5 г а.в./дка	14	
2	Костилкови овощни видове (кайсии, нектарини, сливи)	П	Брашнеста мана (*Podosphaera tridactyla*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-79 (разрастване на яйчника;окапване на завързи след цъфтежа-плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина)	2	12-14	50 мл/100 л работен разтвор	80-150	5	14	

3	Краставици, пъпеши	П,О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-85 (поява на първи цвят по главното стъбло-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л. работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
4	Лозя (десертни и винени сортове, за стафиди)	П	Брашнеста мана (*Uncinula necator)* Черно гниене (*Guignardia budwellii*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 53-79 (съцветията се виждат изцяло-повечето от зърната се събират,грозда се затваря)	3	10-14	30 мл/100 л. работен разтвор	40-100	3	14	
5	Тютюн	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-99 (начало на формиране на странични стъбла – пълна зрялост, реколтиране)	3	10-14	0,05% при 100 л/дка работен разтвор	20-100	5	-	
6	Домати	П,О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-85 (видима поява на първо връхно разклонение-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле, 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л работен разтвор	30-100	3,5-5	3	
7	Роза	П,О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae*), ръжда (*Phragmidium mucronatum*)	Конвенционална наземна техника	При поява	2-поле 4-оранжерии	10 7	50 мл/дка	15-100	5	-	

8	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли)	П	Брашнеста мана (*Podosphaera leucotricha*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-78 (размер на завърза до 10 мм;след цъфтежно окапване-плодовете са достигнали 80% от окончателния си размер)	3	12-14	25 - 50 мл/100 л работен разтвор	50-150	2,5	14	
9	Корнишони, дини, тикви	П,О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (поява на първи цвят по главното стъбло-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле, 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
10	Тиквички	П,О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-79 (поява на първи цвят по главното стъбло-девет и повече плода с типична форма и големина)	2-поле, 4-оранжерии	10-14	35-50 мл/100 л работен разтвор	50-100	3,5-5	3	
11	Патладжан	П,О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (първо съцветие изправена пъпка; първа цветна пъпка-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле, 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л. работен разтвор	30-100	3,5-5	3	
12	Пипер	П,О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-85 (пето съцветие; пети цвят-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2-поле, 4-оранжерии	10-12	35-50 мл/100 л. работен разтвор	50-100	3,5-5	3	

13	Ягоди	П,О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca macularis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-81 (поява на столони:дължината на столоните е около 2 см-начало на узряване: повечето плодове са бели)	2-поле, 4-оранжерии	10-14	50 мл/дка	50-100	5	3	
14	Малини, къпини	П	Брашнеста мана (*Podosphaera aphanis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-81 (видими първи цветни пъпки-начало на узряване: повечето плодове са бели)	1	-	40 мл/100 л. работен разтвор	50-100	4	3	
15	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-81	2	10-12	50 мл/дка	50-100	5	14	
16	Декоративни и украсни видове (бегония, далия, невен, хризантема, мушкато)	П,О	Брашнеста мана, ръжда	Конвенционална наземна техника	При поява	2-поле 4-оранжерии	10 7	50 мл/дка	15-100	5	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № .....

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между прилож (мин)	мл продукт /дка Мин//макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Касис, цариградско грозде	П	Брашнеста мана (*Podosphaera aphanis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-79 (цветните и листни пъпки набъбват, още са затворени-плодовете са достигнали около 90% от крайния си размер)	2	7-14	0,05% при 100 л/дка работен разтвор	50-100	5	20	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

Приложение № 3 към Заповед № РД-2061/19 10 11

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Запалими течност и пари, категория 3 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда, остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда, хронична опасност, категория 1	H226 H319 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Внимание	H226 H319 H410	EUH401	SP фрази: SP1,SPe3