ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ШАРПЕН 33 ЕК
Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при широк спектър от култури

ГРУПА	3	ХЕРБИЦИД

UFI: WPP8-6GJ2-670P-7WFX



ОПАСНО
Съдържа Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Предупреждения за опасност:
H226 Запалими течност и пари
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361d Предполага се, че уврежда плода
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност:
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ защитни очила/ предпазна маска за лице
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство.

Допълнително етикетиране:
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до

повърхностни води./ Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или пътища).
SPo2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми и дюзи с редуциране на отвяването на струята 75%, включително и растителнозащитна ивица от 20 метра.
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до растенията, които не са обект на третиране.
Да се прилага веднъж на вегетационен период.

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Съдържание на активното вещество – пендиметалин 330 г/л
Функция на продукта – Хербицид.
Вид на формулацията – Емулсионен концентрат (ЕК).
Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД 11-1981 / 10.12.2014 г., Заповед №: РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед №: РД 11-1661/06.11.2015 г и Заповед РД 11-87/16.01.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01279-ПРЗ/З-14.02.2017 г.
Категория на употреба - втора професионална

Разрешени употреби
Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели:

Култура	**Доза (мл продукт/дка)**	**Момент на приложение**	**Количество вода (л /дка)**
Слънчоглед, Царевица , Фасул	360-600	След сеитба преди поникване Прилага се през пролетта	20-80
Соя	300-600	След сеитба преди поникване	25-60
Грах (за консервиране), Нахут, Картофи,	360-600	След сеитба преди поникване	25-80
Тютюн	360-600	Преди разсаждане	25-80
Моркови, Ряпа	300-600	След сеитба преди поникване	25-80
Аспержи	400-600	Период на покой	25-80
Пипер, Памук	400-600	След сеитба преди поникване или преди разсаждане	25-80
Марули, Ендивия	300-600	След сеитба преди поникване или преди разсаждане	25-80
Карфиол	300-600	Преди разсаждане	25-80
Цикория	300-500	Преди разсаждане	25-80
Козя брада	240	След сеитба преди поникване	25-80
Лупина	360	След сеитба преди поникване	25-80
Топола	280-360	Директно почвено приложение между редовете След разсаждане	25-80
Лозя (десертни и винени сортове)	400-600	Директно почвено приложение между редовете В периода на зимен покой	25-80
Ябълки, Круши, Дюли, Кайсии, Праскови, Нектарини, Цитрусови култури (портокали,	400-600	Директно почвено приложение между редовете В периода между прибиране на	25-80

лайм, мандарини, грейпфрут, помело)		реколтата и оформяне на завръза	
Овощни разсадници	400-600	Преди или след разсаждане Преди разсаждане – площно приложение След разсаждане – пръскане с пръскачка с предпазен капак	25-80
Фъстъци	400-600	След сеитба преди поникване	25-80
Декоративни растения и разсадници	300-730	Преди или след разсаждане	25-80
Треви за семена AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST	210-400	След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение) **Да не се прилага при треви за храна на животните.**	25-80

Максимален брой приложения на вегетационен период: 1
Техника на приложение: Приложение с наземна техника
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата аспержи – 28 дни; марули, ендивия, цикория – 75 дни; при всички останали - ограничен от фазата на приложение

Забележки:
Да се прилага веднъж на вегетационен период, върху добре изравнена и обработена почва.
Период на изчакване за засяване/засаждане на следващите култури: 180 дни.
Да не се прилага с ръчна пръскачка.
При повторно влизане на работниците да се носят подходящи ръкавици.
Да се носят подходящи ръкавици и защитно облекло по време на смесване/зареждане и приложение на продукта.

Контролирани плевели
Едногодишни житни плевели: Полска лисича опашка **(***Alopecurus myosuroides*), кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), кокоше просо *(Echinochloa crus-galli*), видове кощрява (*Setaria spp*.), диво просо (*Panicum dichotomiflorum*).
Едногодишни широколистни плевели: видове щир ***(****Amaranthus spp.),* видове лобода (*Atriplex spp*.), обикновена знойка (*Heliotropium europaeum*), овчарска торбичка (*Capsella bursa pastoris*), бяла куча лобода (*Chenopodium album*), видове млечка (*Euphorbia spp.),* лечебен росопас (*Fumaria spp*.), полска незабравка (*Myosotis arvensis*), полски пролез (*Mercurialis annua*), див мак (*Papaver rhoeas*), обикновена тученица (*Portulaca oleracea*), видове пипериче (*Polygonum spp*.), черно куче грозде *(Solanum nigrum*), попова лъжичка (*Thlaspi arvenses*), гръцка коприва *(Urtica urens*), видове великденче *(Veronica spp*.)

Фитотоксичност и презасяване на площи третирани с продукта
За съвет относно чувствителността на културите и презасяване на площта след пропадане на културата, се консултирайте с дистрибутора на продукта.

Резистентност
За да се предотврати появата на резистентност у плевелните популации, винаги да се спазват препоръките на етикета и редовно да се наблюдават полетата за каквито и да било признаци на слаб контрол. Да се използват хербициди с различни механизми на действие.

Приготвяне и прилагане на работен разтвор
Никога да не се приготвя по-голямо количество разтвор, отколкото е необходимо.
При приготвянето на сместа, напълнете резервоара на пръскачката до половината с чиста вода и включете бъркалката. Добавете Шарпен 33 ЕК в резервоара при продължаващо разбъркване и след това допълнете с вода. Продължете разбъркването до приключване на пръскането. Използвайте воден спрей с фина или средна капка, за да се гарантира по-добро и равномерно покритие.

Почистване на оборудването
Почистете оборудването веднага след употреба като използвате детергент.
Поради хербицидното действие на продукта, се препоръчва цялостна грижа и почистване на оборудването, за да се избегне замърсяване по време на работа и обезвреждане, с цел да се предотврати непреднамерено увреждане на растенията и околната среда.

Работа с продукта
Да не се допуска попадане на разтвор или промивни води съдържащи продукта в канализационната система. Да не се замърсяват повърхностните води или канализацията с продукта или използваната опаковка.
Да се държи далеч от деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото или вдишването на продукта. По време на работа да не се яде, пие или пуши. Да се измият ръцете след употреба. Да се свали замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене. Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.

Съхранение
Да се съхранява на място недостъпно за деца, в затворена оригинална опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина. Да се държи далеч от храна, напитки, фуражи, семена и тор. Да не се замърсяват други продукти на склад или складова площ при обработката или съхранението на този продукт.

Мерки за оказване на първа помощ
Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно).
Първа помощ при вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.
Първа помощ при контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун.
Първа помощ при контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно потърсете медицинска помощ.
Първа помощ при поглъщане : Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Подходящи пожарогасителни средства: Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.

Подходящи методи за обезвреждане на остатъците от продукта
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение
Дата на производство: виж опаковката
Партиден №: виж опаковката
Съдържание на опаковката: 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л

Притежател на разрешението:
Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142
1702 Dilbeek
Belgium

Дистрибутор:

