СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ РД11-1981

София, 10-12- **2014 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията *(обн, ДВ. бр. 61 от 2014 г.)*, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 18644/29.10.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7134/11.04.2014 г. от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.", Белгия,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта:	Шарпен 33 ЕК
Активно вещество:	Пендиметалин – 330 г/л

Производител на продукта за растителна защита – „Шарда Кропчем Лимитед", Индия
Производител на активното вещество: пендиметалин – „Шарда Кропчем Лимитед", Индия
Функция на продукта за растителна защита: хербицид
Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: бутилка - 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 литра; HDPE/EVOH или HDPE/PA
Срок на годност: 2 години.

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или пътища);
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми и дюзи с редуциране на отвяването на струята 75%, включително и растително защитна ивица от 20 метра;
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до растенията, които не са обект на третиране;
- Цялото защитно облекло да се изпере след употреба;
- Изчаквателен период за засяване/засаждане на следващите култури: 180 дни.
- Да не се прилага с ръчна пръскачка.
- При повторно влизане на работниците да се носят подходящи ръкавици.
- Да се носят подходящи ръкавици и защитно облекло по време на смесване/зареждане и приложение на продукта.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
Шарпен 33ЕК	(a)	(b)	(c)	Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	г/мл продукт /дка Мин//макс	Вода L/дка Мин// макс	гр. а.в./дка	(l)	(m)
Шарпен 33ЕК	Слънчоглед, царевица	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	360-600 мл/дка	20-80	120-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на прилложение	Прилага се през пролетта.
	Фасул						След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	360-600 мл/дка	20-80	120-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на прилложение	Прилага се през пролетта.

Шарпен 33ЕК	Соя		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	300-600 мл/дка	25-60	100-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Грах (за консервиране), нахут						След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	360-600 мл/дка	25-80	120-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Моркови, ряпа						След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	300-600 мл/дка	25-80	100-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

Шарпен 33ЕК	Аспержи		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	Период на покой	1	-	400-600	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	28 дни	
	Картофи						След сеитба, преди поникване (ССПП)	1	-	360-600 мл/дка	25-80	120-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Тютюн						Преди разсаждане	1	-	360-600 мл/дка	25-80	120-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

	Пипер		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	ССПП или преди разсаждане	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Марули						ССПП или преди разсаждане	1	-	300-600 мл/дка	25-80	100-200 г. пендиметалин/дка	75 дни	
Шарпен 33ЕК	Ендивия						ССПП или преди разсаждане	1	-	300-600	25-80	100-200 г. пендиметалин/дка	75 дни	

	Карфиол		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	Преди разсаждане	1	-	300-600 мл/дка	25-80	100-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Цикория						Преди разсаждане	1	-	300-500 мл/дка	25-80	100-164 г. пендиметалин/дка	75 дни	
Шарпен 330ЕК	Козя брада						ССПП	1	-	240 мл/дка	25-80	80 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

	Лупина		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	ССПП	1	-	360 мл/дка	25-80	120 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Памук						ССПП или преди разсаждане	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
Шарпен 33ЕК	Топола					Директно почвено приложение между редовете	След разсаждане	1	-	280-360 мл/дка	25-80	92-120 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

	Лозя (винени и десертни сортове)		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Директно почвено приложение между редовете	В периода на зимен покой	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Ябълки, круши, дюли						В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
Шарпен 33ЕК	Кайсии, праскови, нектарини						В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

	Овощни разсадници		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	Преди или след разсаждане	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело)					Директно почвено приложение между редовете	В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
Шарпен 33ЕК	Фъстъци					Приложение с наземна техника	ССПП	1	-	400-600 мл/дка	25-80	132-200 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	

	Декоративни растения и разсадници		Едногодишни житни и широколистни плевели	400 г/л пендиметалин	СК	Приложение с наземна техника	Преди или след разсаждане	1	-	300-730 мл/дка	25-80	100-240 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	
	Треви за семена AGSTE ALOPR ARRAL CYXCR DECCA, LOLSS PHLPR POASS FESSS AGSST						След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)	1	-	210-400 мл/дка	25-80	68-132 г. пендиметалин/дка	Ограничен от фазата на приложение	Да не се прилага при треви за храна на животните.

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Забележка: Да се прилага веднъж на вегетационен период.

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	***Етикетиране***	***Специфични предпазни мерки за безопасност***
Xn - вреден N – опасен за околната среда R фрази: R10, R38, R50/53, R65, R66	Xn - вреден N – опасен за околната среда R фрази: R10, R38, R50/53, R65, R66 Съдържа пендиметалин, може да предизвика алергична реакция. S фрази: S1/2, S13, S16, S20/21, S23, S29, S35, S36/37, S46, S57, S62	SP фрази: SP1, SPe3, Spo2

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		***Етикетиране***			
Код(ове) на класа и категорията на опасност	***Код на предупреждението на опасност***	***Кодове на пиктограмите иа сигналните думи***	***Код (ове) на предупреждението за опасност***	***Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност***	***Специфични предпазни мерки за безопасност***

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата, на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.07.2017 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на фирма „Шарда Европа б.в.б.а.", Белгия.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПГ/КАПРЗ/РЗК/БАБХ