СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ ..РД 11-526

София, ...29.04..... **2013 г.**

На основание чл. 15д, ал. 5 от Закона за защита на растенията и т. 6 от Предложение с вх. № 5250/12.04.2013 г. на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 11837/16.12.2011 г. на „Байер КропСайънс АГ", Германия

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Разрешавам пускането на пазара и употребата на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

ДЕЦИС 100 ЕК

Делтаметрин – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита - „Байер КропСайънс СА" - Франция

Производител на активното вещество – „Байер КропСайънс АГ" - Германия

Употреба:

- **Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени срещу следните вредители:**

- Листна въшка *(Hyalopterus spp.)*, ябълков плодов червей *(Laspeyresia pomonella)*, кестенов молец *(Laspeyresia splendana), в доза 10,5 – 12,5 мл/дка;*

- Бадемов семеяд *(Eurytoma plotnikovi), в доза 12,5 мл/дка;*

- **Ябълки, круши, дюли, мушмули срещу следните вредители**:

- Ябълков плодов червей *(Laspeyresia pomonella)*, ябълкова листна бълха *(Psylla mali)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi)*, живовлекова листна въшка *(Dysaphis plantaginea), в доза 7,5 -12,5 мл/дка;*

- Плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*,розена листозавивачка *(Archips rosanus), в доза 8,75 – 12,25 мл/дка;*

- Обикновена крушова листна бълха *(Psylla pyri) в доза 12,25 мл/дка;*

- **Праскови, нектарин,кайсии, сливи, череши, вишни:**

- Плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*,розена

листозавивачка *(Archips rosanus),* прасковен молец *(Anarsia lineatella), в доза 8,75 – 12,25 мл/дка;*

- Черешова муха *(Rhagoleris cerasi), в доза 10 – 17,5 мл/дка.*

- Средиземноморска плодова муха *(Ceratitis capitata) в доза 12,5 – 17,5 мл/дка.*

- Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*), черешова листна въшка *(Myzus cerasi),* прашеста сливова листна въшка *(Hyalopterus pruni),* сливов плодов червей *(Laspeyresia funebrana, в доза 7,5 -17,5 мл/дка*

- **Лозя, срещу следните вредители** :

- Шарен гроздов молец *(Lobesia botrana), в доза* 12,5 *мл/дка* (първо поколение) 12,5 - 17,5 *мл/дка* (второ и трето поколение)*;*

- Еднопоясен гроздов молец *(Clysia ambiguella), в доза* 12,5 - 17,5 *мл/дка;*

- Лозова цикадка *(Empoasca spp.), в доза* 12,5 *мл/дка;*.

- **Ягоди (и в оранжерии), срещу следните вредители:**

- Листни въшки *(Aphis spp.), в доза 6,25 – 12,5 мл/дка;*

- **Кромид, праз, чесън, срещу следните вредители:**

- Тютюнев трипс *(Thrips tabaci),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза 7,5 – 12,5 мл/дка;*

- **Домат, пипер и патладжан срещу следните вредители:**

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua),* колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*), памукова листна въшка *(Aphis gossypii),* голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui), Hyperomyzus lactucae, в доза 7,5 - 12,5 мл/дка;*

- Южна зелена миризливка *(Nezara viridula), в доза 4,5 – 7,5 мл/дка;*

- Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза 7,5 – 12,5 мл/дка;*

- **Пипер (оранжериен) срещу следните вредители:**

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua),* колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata*), зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*), памукова листна въшка *(Aphis gossypii),* голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui), Hyperomyzus lactucae, в доза 7,5 – 17,5 мл/дка;*

- Южна зелена миризливка *(Nezara viridula), в доза 4,5 – 10,5 мл/дка;*

- Оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum), в доза 10,5 – 17,5 мл/дка;*

- **Домат и патладжан (оранжериини) срещу**

следните вредители:

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки *(Spodoptera spp.),* колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*), памукова листна въшка *(Aphis gossypii),* голяма сливова листна въшка *(Anuraphis cardui), Hyperomyzus lactucae, в доза 7,5 – 12,5 мл/дка;*

- Южна зелена миризливка *(Nezara viridula), в доза 4,5 – 10,5 мл/дка;*

▪ **Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини (и в оранжерии), срещу следните вредители:**

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* нощенки *(Spodoptera spp.),* листни въшки *(Aphis spp., Hyperomyzus lactucae), в доза* 7,5 -12,5 *мл/дка* (на открито) 7,5 -17,5 *мл/дка* (в оранжерия)*;*

- Подгризваща нощенка *(Agrotis spp) –на открито, в доза* 7,5 -12,5 *мл/дка;*

▪ **Зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи, срещу следните вредители:**

- Зелева пеперуда *(Pieris spp.),* зелева нощенка *(Mamestra brassicae),* гамозначна нощенка *(Plusia gamma),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae),*зелева листна въшка *(Brevicorne brassicae),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5 -12,5 *мл/дка;*

- Диамантен молец *(Plutella xylostella), в доза* 12,5 *мл/дка;*

▪ **Марули, срещу следните вредители:**

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua),* сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites),* листни въшки по салатата *(Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.), в доза* 6,25-12,5 *мл/дка;*

- Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

▪ **Спанак, срещу следните вредители:**

- Листни въшки *(Aphis spp.),* малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua),* зелева нощенка *(Mamestra spp.),* сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites), в доза* 8,75 *мл/дка;*

▪ **Магданоз, целина, рукола, цикория срещу следните вредители:**

- Листни въшки *(Aphis spp.),* Малка полска нощенка *(Spodoptera exiqua),* Зелева нощенка *(Mamestra spp.),* сребристоточкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites), в доза* 8,75*мл/дка;*

- Подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5

мл/дка;

- **Фасул, леща, нахут срещу следните вредители:**

- Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae, Aphis spp.),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

- **Грах срещу следните вредители:**

- Зелена грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum),* грудков хоботник *(Sitona spp.), в доза 6,25 мл/дка;*

- черна бобова листна въшка *(Aphis fabae),* тъмна грахова листозавивачка *(Laspeyresia nigricana), Thrips angusticeps*, подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5*мл/дка;*

- **Артишок срещу следните вредители:**

- Щитовка *(Cassida spp.), в доза* 12,5 *мл/дка;*

- Тютюнев червей *(Spodoptera litura),* листни въшки *(Anuraphis cardui, Myzus persicae), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

- **Картофи, срещу следните вредители:**

- Колорадски бръмар *(Leptinotarsa decemlineata,), в доза* 12,5 *мл/дка;*

- Египетска нощенка по памука *(Spodoptera littoralis), в доза 7,5* - 12,5 *мл/дка;*

- **Памук срещу следните вредители:**

- Розов червей по памука *(Pectinophora gossypiella),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera), в доза* 12,5 – 17,5 *мл/дка;*

- Тютюнева белокрилка *(Bemisia tabaci),* южна цикадка *(Empoasca spp.), в доза 12,5 мл/дка;*

- нощенки *(Spodoptera spp.),* памукова листна въшка *(Aphis gossypii),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

- **Тютюн срещу следните вредители:**

- Тютюнев трипс *(Thrips tabaci),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp,), в доза* 7,5 – 12,5 *мл/дка;*

- **Захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло срещу следните вредители:**

- Черна бобова листна въшка *(Aphis fabae),* зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*), цвеклова муха *(Pegomya spp.),* западна цвеклова бълха *(Chaetocnema tibialis),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.),* полска нощенка *(Spodoptera spp.), в доза* 7,5-12,5*мл/дка;*

- Цвеклова щитовка *(Cassida nebulosa), в доза 12,5 мл/дка;*

- **Царевица срещу следните вредители:**

- Царевичен стъблен пробивач *(Ostrinia nubialis), Sesamia nonagrioides,* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.),* полска нощенка *(Spodoptera spp.),* памукова нощенка

(Helicoverpa armigera), брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi),* овесена листна въшка *(Sitobion avenae), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

- Западен царевичен коренов червей *Diabrotica virgifera, в доза 12,5 мл/дка;*

▪ **Пшеница, ечемик, ръж, овес срещу следните вредители:**

- Брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi),* овесена листна въшка *(Sitobion avenae),* подгризваща нощенка *(Agrotis spp.), в доза* 7,5-12,5 *мл/дка;*

▪ **Люцерна срещу следните вредители:**

- Грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum),* детелинов хоботник *(Apion pisi),* малък люцернов листов хоботник *(Hypera postica), в доза* 6,25 *мл/дка;*

▪ **Декоративни растения срещу следните вредители:**

- Листни въшки *(Myzus spp.)* Тютюнев трипс *(Thrips tabaci), в доза* 6,25-12,5 *мл/дка;*

- Листозавивачки *(Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.), в доза* 4,375-8,75 мл/дка;

- Оранжерийна белокрилка *(Trialeurodes vaporariorum), в доза 12,3 мл/дка;*

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: II

Техника на приложение: с ковенционална техника

Момент на приложение:

При бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени – за *бадемов семеяд* се третира в началото на цъфтежа;

За всички останали случай при поява на вредителя;

Максимален брой приложения:

За бадеми, фъстъци,лешници, орехи, кестени, ябълки, круши, дюли, мушмули, зеле (с из-ключение на китайско зеле), карфиол, броколи, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, фасул, леща, нахут, грах, памук, люцерна максималния брой приложения - 2;

За праскови, нектарин,кайсии, сливи, череши, вишни, захарно цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес максималния брой приложения – 1;

За лозя, ягоди, кромид, праз, чесън, домат, пипер, патладжан краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, картофи, артишок, царевица, декоративни растения, тютюн – 3;

За пипер, домат, патладжан – 4;

Интервал между третиранията:

За бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени, ябълки, круши, дюли, мушмули, лозя, ягоди, кромид, праз, чесън, зеле (с из-ключение на китайско зеле), карфиол, броколи, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, фасул, леща, нахут, грах, картофи, памук люцерна, - 14 дни;

За домат, пипер, патладжан, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, артишок, тютюн, декоративни растения - 7 дни;

За захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло – 1 ден;

За царевица при приложение за царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubialis), Sesamia nonagrioides, подгризваща нощенка (Agrotis spp.), полска нощенка (Spodoptera spp.), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), брястова листна въшка (Rhopalosiphum padi), овесена листна въшка (Sitobion avenae) – 14 до 21 дни;

За царевица при приложение за западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera – 7 до 14 дни;

Количество на работен разтвор: 40 до 140 л/дка;

Карантинен срок:

Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло, царевица, памук – 30 дни;

Ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарин,кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, зеле (с из-ключение на китайско зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, нахут, грах, картофи, тютюн, – 7 дни;

Ягоди, домат, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, артишок – 3 дни;

Люцерна – 14 дни;

Символи за опасност:

N - Опасен за околната среда; Xn - вреден

R фрази: R20/22; R37; R41; R50/53; R65; R66;

S фрази: S1/2; S13; S20/21; S23; S24; S26; S36/39; S46; S60; S61; S62;

SP фрази: SP1;

SPe фрази: SPe3; SPe8

Забележка:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м при овощни и маслинови насаждения, 20 м при лозя и 10 м при зеленчукови и други подобни насаждения до повърхностни води с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране. За да се защитят нецелевите членестоноги, да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м от необработваема земя.
- Опасен за пчелите. Да не се прилага върху култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. След употреба пчелите трябва да останат в кошерите им за един ден, осигурявайки им храна и вода вътре или кошерите да се отдалечат.

II. На основание чл. 32, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) разрешаването за пускане на пазара и употребата на продукта е валидно до 31 октомври 2017 г.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на „Байер България" ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ВЕНЦЕСЛАВА ТАСЕВА – СОКОЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТХ/КБИПРЗ/ПРЗТ/БАБХ