РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

14.4.2025 г.

X РД11-1161/14.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 58 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 47 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11743/05.06.2024 г. от Биофа ГмбХ, Германия, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 3346/07.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВИТИСАН** (продукт за растителна защита с нисък риск)

Активно вещество: калиев хидроген карбонат / potassium hydrogen carbonate - 989.9 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Биофа ГмбХ, Германия

Производител на активното вещество калиев хидроген карбонат: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на Биофа ГмбХ, Германия.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: прах, разтворим във вода (СП)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 кг торба от PET-AL-PE

5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг торба от LDPE/PE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/ зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество калиев хидроген карбонат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.10.2037 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ВИТИСАН се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ВИТИСАН съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Биофа ГмбХ, Германия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

14.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

14.4.2025 г.

X РД11-1161/14.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: ВИТИСАН
Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
Концентрация на активно вещество: калиев хидроген карбонат (989.9 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прило жен. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Лозя (VITVI) (винени и десертни сортове)	П	Брашнеста мана *(Uncinula necator)* (UNCINE)	Конвен ционална наземна техника.	BBCH 12-85 (вторите листа са отворени - омекване на зърната)	6	3	Основна доза на приложение: 300 г продукт /дка	40 л/дка	297 г а. в./ дка	-	-
								BBCH 61: 600 г продукт /дка	80 л/дка	593 г а. в./ дка	-	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

								BBCH 71: 900 г продукт /дка	120 л/дка	890 г а. в./ дка	-	-
								BBCH 75: 1200 г продукт /дка	160 л/дка	1190 г а. в./ дка	-	-
2.	Семкови овощни видове (NNNOK) Ябълки, круши, дюли, круша наши	П	Струпясване *(Venturia sp.)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 09-85 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа - напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)	6	3	250 г продукт/дка на метър височина на короната	50 л/дка	247 г а. в./ дка	-	-
3.	Червено френско грозде (RIBRU), бяло френско грозде (RIBRW), черно френско грозде (RIBNI), йостабери (RIBNG)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 (увяхване на цветовете: окапали са повечето венчелистчета - плодчетата в основата на грозда капят лесно. (начало на откъсване на плодовете)) при опасност от заразяване	4	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а. в./ дка	-	-
4.	Цариградско грозде (RIBUC)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 (увяхване на цветовете: окапали са повечето венчелистчета - плодчетата в основата на грозда капят лесно. (начало на откъсване на плодовете))	4	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а. в./ дка	-	-

					при опасност от заразяване							
5.	Видове боровинка (VACSS)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 при опасност от заразяване	4	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
6.	Малина (RUBID), къпина (RUBFR), логанбери (RUBLO)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 при опасност от заразяване	4	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
7.	Праскова (PRNSP)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 (увяхване на цветовете-консумативна зрелост) при опасност от заразяване	4	5	250 г/дка на метър височина на короната	25-50 л/дка на метър височина на короната	247 г а.в./дка на метър височина на короната	-	-
8.	Слива (PRNDO)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 – 89 (увяхване на цветовете-консумативна зрелост) при опасност от заразяване	4	5	250 г/дка на метър височина на короната	25-50 л/дка на метър височина на короната	247 г а.в./дка на метър височина	-	-

										на корона та		
9.	Череша (PRNAV)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвен ционална наземна техника	BBCH 67 – 89 (увяхване на цветовете-консумативна зрелост) при опасност от заразяване	4	5	250 г/дка на метър височина на короната	25-50 л/дка на метър височ ина на корон ата	247 г а.в./ дка на метър височи на на корона та	-	-
10.	Пресни билки (NNNKF), Ароматни билки, (NNNAK), Билки за чай (NNNTK)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвен ционална наземна техника	BBCH 10 – 49 при опасност от заразяване	4	5	500 г продукт /дка	30-100 л/дка	495 г а. в./ дка	-	-
11.	Ягоди (FRAAN)	П	Брашнеста мана *(Podosphaera aphanis)* (PODOAP), брашнеста мана *(Leveillula taurica)* (LEVETA), брашнеста мана *(Sphaerotheca)* (SPHAER)	Конвен ционална наземна техника	BBCH 10 – 85 (поява на първи лист-първи плодове със специфичния за сорта цвят) при опасност от заразяване	6	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а. в./ дка	-	-
12.	Цариградско грозде (RIBUC)	П	Брашнеста мана *(Sphaerotheca morsuvae* (SPHRMU)), брашнеста мана *(Uncinila necator* (UNCINE))	Конвен ционална наземна техника	BBCH 10 – 85 при опасност от заразяване	6	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а. в./ дка	-	-

13.	Червено френско грозде (RIBRU), черно френско грозде (RIBNI), йостабери (RIBNG)	П	Брашнеста мана *Podosphaera aphanis* PODOAP, *Sphaerotheca* SPHAER	Конвенционална наземна техника	BBCH 10 – 85 (листните връхчета се издигат над люспите, някои от листата отделени - напреднало узряване: първите плодчета са узрели) при опасност от заразяване	6	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
14.	Малина (RUBID), Къпина (RUBFR), Логанбери (RUBLO)	П	Брашнеста мана *(Podosphaera aphanis)* (PODOAP), *Sphaerotheca* SPHAER	Конвенционална наземна техника	BBCH 10 – 85 при опасност от заразяване	6	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
15.	Ягоди FRAAN	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	BBCH 67 -89 (Цветовете увяхват, повечето венчелистчета са паднали- втора реколта: повечето плодове са оцветени)	4	5	500 г продукт /дка	50-200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1161/14.04.2025 г.

Приложение № 2 на разрешените
минимални употреби
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: ВИТИСАН
Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
Концентрация на активно вещество: калиев хидроген карбонат (989.9 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Семкови овощни видове (NNNOK)	П	Антракноза (*Gloeosporium (gloeos))*	Конвенционална наземна техника	BBCH 74-87 (размер на плода до 40 mm; изправяне на плода- беритбена зрелост) при опасност от заразяване	6	5-7	250 г/дка на метър височина на короната	50 л/дка на метър височина на короната	247 г а.в./дка на метър височина на короната	-	-
2.	Аспержи ASPOF (млади насаждения)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	в началото на заразяване и/или при поява на първи симптоми	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 100 л/дка	495 г а.в./дка	-	-

3.	Аспержи ASPOF (добиви на културата)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	след прибиране на реколтата в началото на заразяване и/или при поява на първи симптоми	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 100 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
4.	Тиквички (CUUPG), тиква (CUUPM), краставица (CUMSA)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	от BBCH 51 (поява на първи цвят по главното стъбло) в случай на опасност от заразяване	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 120 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
5.	Пъпеш (CUMME), диня (CITLA)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	от BBCH 51 (поява на първи цвят по главното стъбло) в случай на опасност от заразяване	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 120 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
6.	Мускатна тиква (CUUMO), едроплодна тиква (CUUMX) тиква (CUUPE) тиква кратуна (LGNSI)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	от BBCH 51 (поява на първи цвят по главното стъбло) в случай на опасност от заразяване	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 120 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
7.	Лукови култури NNNSZ (използване като обикновен лук и лук на връзка)	П	Видове сиво гниене (*Botrytis* sp.) (BOTRSP)	Конвенционална наземна техника	в случай на опасност от инфекция	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 100 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
8.	Ендивия (CICEN), полска мотовилка (VLLLO)	П	Брашнести мани (ERYSSP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 в случай на опасност от инфекция	10	5-7	300 г продукт /дка	макс. 60 л/дка	494 г а.в./дка	-	-

9.	Френски фасул (climbing french bean (PHSVV))	П	Видове сиво гниене (*Botrytis* sp.) (BOTRSP)	Конвенционална наземна техника	от BBCH 51 (първите цветни пъпки се виждат) в случай на опасност от инфекция	6	5-7	височина на растението < 50 см: 250 г продукт /дка височина на растението 50-125 см: 375 г продукт /дка височина на растението повече от > 125 см: 500 г продукт /дка	височина на растението < 50 см: в 60 л/дка височина на растението 50-125 см: в 90 л/дка височина на растението повече от > 125 см: в 120 л/дка	височина на растението < 50 см : 247 г а.в./дка височина на растението 50-125 см: 371 г а.в./дка височина на растението повече от > 125 cm: 449 г а.в./дка	-	-
10.	Фасул (dwarf french bean (PHSVN))	П	Видове сиво гниене (*Botrytis* sp.) BOTRSP	Конвенционална наземна техника	от BBCH 51 (първите цветни пъпки се виждат) в случай на опасност от инфекция	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 120 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
11.	Подобни на френско грозде култури (NNNOJ)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	BBCH 59-89 (фаза "грозд": отделени са всички цветни пъпки-плодчетата в основата на грозда капят лесно (начало на откъсване на плодовете)) в	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 100 л/дка	495 г а.в./дка	-	-

					случай на опасност от инфекция							
12.	Малина (RUBID), къпина (RUBFR)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	BBCH 59-89 в случай на опасност от инфекция	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 100 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
13.	Ягода (FRAAN)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea* (BOTRCI))	Конвенционална наземна техника	BBCH 59-89 (масова бутонизация-втора реколта: повечето плодове са оцветени) в случай на опасност от инфекция	6	5-7	500 г продукт /дка	макс. 200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-
14.	Декоративни видове (NNNZZ)	П	Брашнести мани ERYSSP	Конвенционална наземна техника	в началото на заразяване и/или при поява на първи симптоми	10	5-7	500 г продукт /дка	макс. 200 л/дка	495 г а.в./дка	-	-

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

14.4.2025 г.

X РД11-1161/14.04.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401	SP 1