СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

З А П О В Е Д

№ РД 11-241

София, 11.02 **2015 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (обн. *ДВ, бр. 61 от 2014 г.*), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 663/14.01.2015 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11383/23.06.2014 г. на фирма Синджента България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: ОРТИВА ТОП СК

Активно вещество: Азоксистробин – 200 г/л
Дифеноконазол – 125 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Синжента Сплай AG, Швейцария

Производителна активното вещество азоксистробин - Синжента Сплай AG

Производител на активното вещество дифеноконазол - Синжента Сплай AG

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 160 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1л, 2 л, бутилки (HDPE или PET); 2, 5, 10 и 20 литра бидони (HDPE или PET)

Срок на годност: 2 години

Забележки:

- Компетентният орган не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от използването на ОРТИВА ТОП СК при минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън.
- Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или при фитотоксичност при употреба върху минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън е на лицето, прилагащо продукта.
- Употребата при минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън да се означи отделно на етикета.
- Употребата при ягоди (в оранжерии) ще се счита разрешена съгласно предложената добра земеделска практика, когато бъдат ревизирани MRLs с Регламент 396/2005 г. Притежателят на разрешението е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган.
- Да не се прилага в разсадници /при производство на разсад/.
- Да не се прилага по-рано от 3 седмици след сеитба/засаждане.
- Да не се прилага при условия на висока влажност.
- Да не се прилага в комбинация с растежни регулатори.
- Да не се допуска отвяване на работния разтвор при прилагане върху култури, съседни на чувствителни сортове ябълки.
- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води или да се използват дюзи с намалено разсейване (50% намаление на разсейването) с цел опазването на водните организми, които не са обект на третирането.
- При малини да се осигури нетретирана буферна зона от 15 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми които не са обект на третирането.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой макс (k)	Интервал между приложен. дни	Мл продукт /дка Мин/ макс	Вода литра/ дка Мин/ макс	Гр. а.в./дка	(l)	(m)
ОРТИВА ТОП СК	Ориз	П	Пирикулариоза (*Pyricularia oryza*) Хелминтоспориоза (*Helmintho-sporium sp.*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 47 - 61 Влагалището на флаговия лист се разтваря - начало на цъфтеж: видими прашници на върха на метлицата	1-2	15	80 -100	20-40	Азоксистробин 16 – 20 г/дка Дифеноконазол 10-12,5 г/дка	28	
ОРТИВА ТОП СК	Броколи Карфиол	П	Алтернариоза по зелевите (*Alternaria brassicae)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 - 55 Главите започват формиране; ширина на нарастваща връх поголяма от 1 $см^3$ - видими първите единични цветчета (още затворени)	1	-	100	20-60	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	14	
ОРТИВА ТОП СК	Зеле	П	Алтернариоза по зелевите (*Alternaria brassicae*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH40 – 55 Начало на формиране на главите - видими първи цветчета на централното стъбло (още затворени)	1	-	100	20-60	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	21	

ОРТИВА ТОП СК	Целина	П	Септориоза (*Septoria apii*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 – 48 Начало на формиране на подлежащите на прибиране вегетативни части - 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат	1	-	100	20-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	14	
ОРТИВА ТОП СК	Краставица Тиквички	П	Брашнеста мана (*Erysiphae cichoracearum , Sphaerotheca fulginea*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 – 89 Начало на формиране на подлежащите на прибиране вегетативни части - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	3	
ОРТИВА ТОП СК	Домати	П	Алтернариоза (*Alternaria spp.)* Брашнеста мана (*Leveillula taurica)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 – 87 Начало на формиране на подлежащите за прибиране вегетативни части - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	7	Възможна сортова чувствителност
		О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica)*										3	
ОРТИВА ТОП СК	Пипер	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 – 87 Начало на формиране на подлежащите за прибиране вегетативни части - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	3	

ОРТИВА ТОП СК	Патладжан	П О	Брашнеста мана (*Oidium neolycopersici, Leveillula taurica)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	ВВСН 40 – 87 Начало на формиране на подлежащите за прибиране вегетативни части - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	7 3	
ОРТИВА ТОП СК	Праз	П	Пурпурни петна (*Alternaria porri)* Ръжда по лука (Puccinia allii*)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	ВВСН 41-45 Основите на листата започват да се удебеляват и /или удължават – достигане на 50% от очакваания диаметър на стъблото	1	-	100	30-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	21	
ОРТИВА ТОП СК	Лук кромид (пресен, пролетен) Чесън	П	Пурпурни петна (*Alternaria porri)* Ръжда по лука (*Puccinia allii*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	ВВСН 41-45 Основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат 50% от очаквания диаметър на луковицата или стъблото	1	-	100	30-60	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	14	
ОРТИВА ТОП СК	Аспержи	П	Ръжда по аспержи (*Puccinia asparagi)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	ВВСН 40-89 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - пълно узряване	1	-	100	30-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	-	

ОРТИВА ТОП СК	Грах	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 59-77 Видими първи венчелистчета, цветовете още са затворени - 70% от достигане типичната дължина на шушулките	2	14	100	30-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	7	
ОРТИВА ТОП СК	Малини	П	Брашнеста мана (*Podosphaera)* Септориоза по малината (*Mycosphaerella navae)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40-89 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - пълна зрялост: плодовете са с характерния си цвят	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	7	
ОРТИВА ТОП СК	Ягоди	О	Брашнеста мана (*Podosphaera spp.)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 Първи отворени цветове (първичен или А цвят) - втора реколта: повечето плодове са оцветени	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	3	Нов dfz MRLs трябва да бъде приложен
ОРТИВА ТОП СК	Магданоз	П	Септориоза *(Septorii apii)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - достигане на крайния им размер	1	-	100	20-60	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	14	

ОРТИВА ТОП СК	Пъпеши Дини	П О	Брашнеста мана (*Erysiphae cichoracearum*, *Sphaerotheca* fuliginea) Краста (*Cladosporium cucumerinum*)	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40-89 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост	1	-	100	50-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	3	При пъпешите е възможна сортова чувствителност
ОРТИВА ТОП СК	Артишок	П	Брашнеста мана *(Erysiphae cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 - 55 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - видими първи самостоятелни цветове	1	-	100	30-100	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	7	
ОРТИВА ТОП СК	Моркови	П	Листно гниене при моркова (*Alternaria dauci)*	Азоксистробин 200 г/л Дифеноконазол 125 г/л	СК	Листно приложение/ конвенционална наземна техника	BBCH 40 - 49 Начало на нарастване на подлежащите на прибиране вегетативни части – достигане на крайния им размер	1	-	100	20-60	Азоксистробин 20 г/дка Дифеноконазол 12,5 г/дка	14	

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Еетикетиране	
		Специфични предпазни мерки за безопасност
Xn – Вреден N – Опасен за околната среда R фрази: R20, R 43, R51/53	Xn – Вреден N – Опасен за околната среда R фрази: R20, R43 R51/53 S фрази: S2, S13, S20/21 S35, S36/37, S57	SP фрази: SP1, Spe3

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите иа сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Може да причини алергична кожна реакциа, Сенсебилизация, Категория 1, 1А, 1В	H317 H332 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H332 H410	EUH401	SP фрази: SP1 SPe3
Вреден при вдишване, Остра токсичност, Категория 4					
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект, Хронична опасност, Категория 1					

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2019 г.

III. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на фирма Синджента България ЕООД.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР