РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ .РД.11-.923

София, ...30..05..... **2018 г.**

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Регламент (ЕС) 2018/70 на Комисията от 16 януари 2018 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлорпирифос-метил, ципроконазол, дифеноконазол, флуазинам, флутриафол, прохексадион и натриев хлорид във или върху определени продукти и Предложение с вх. № ВД-1820/14.05.2018 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление вх. № 11954/13.09.2017 г. от фирма *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01299-ПРЗ-1/19.03.2015 г. за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОРТИВА ТОП СК** (съдържащ активните вещества азоксистробин - 200 г/л + дифеноконазол 125 г/л) на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, както следва:

1.1. Разрешените употреби се изменят, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед, поради увеличаване броя на приложенията, заявени от фирма *Синджента България* ЕООД.

2. Промяната в разрешаването на продукта е за срока на неговата валидност.

3. Съществуващите количества от продукта за растителна защита ОРТИВА ТОП СК, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01299-ПРЗ-1/19.03.2015 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните се продават, разпространяват, съхраняват и употребяват до изчерпване на наличните количества.

4. В 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т.1 да се преиздаде.

5. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 / 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД11-923/30.05.2018г.

Търговско наименование на продукта: Ортива Топ СК
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: азоксистробин (200 г/л); дифеноконазол (125 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между прилож е-нията (дни)	г/мл или г/кг продукт /дка	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Ориз	П	Пирикулариоза *(Pyricularia oryza),* Хелминтоспориоза *(Helminthosporium sp.)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 47-61 (влагалището на флаговия лист се разтваря – начало на цъфтеж: видими прашници на върха на метлицата)	1-2	15	80-100 мл/дка	20-40	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	28	-

2	Зеле	П	Алтернариоза при зелевите (*Alternaria brassicae)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-55 (главите започват формиране; ширина на нарастващия връх по-голяма от 1 см³ - видими първите единични цветчета /още затворени/)	1-2	14	100 мл/дка	20-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	21	-
3	Моркови	П	Листно гниене при моркови *(Alternaria dauci)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (корените започват да нарастват (диаметър > 0,5 см.) - нарастването на корена приключено: достигната е типичната форма и размер на корена)	1-3	14	100 мл/дка	20-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	-

4.	Карфиол	П	Алтернариоза при зелевите *(Alternaria brassicae)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 40-55 (главите започват формиране; ширина на нарастващия връх > 1 см ^{3} – видими първите единични цветчета (още затворени))	1-2	14	100 мл/дка	20-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	-
5.	Краставица Тиквичка	П	Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)	1-3	10	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-
6.	Пъпеш Диня	П/О	Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),* Краста *(Cladosporium cucumerinum)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	1-3	8	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-

7.	Домат	П	Алтернариоза *(Alternaria spp.)* Брашнеста мана *(Leveillula taurica)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)	1-3	7	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	7	-
8.	Домат	О	Брашнеста мана *(Leveillula taurica)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 16-87 (6 същински лист - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-3	8	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-
9.	Патладжан	П	Брашнеста мана *(Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-3	7	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	7	-
10.	Патладжан	О	Брашнеста мана *(Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 16-87 (6 същински лист- 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-3	8	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-

11.	Пипер	О	Брашнеста мана *(Leveillula taurica)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-2	10	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-
12.	Ягоди	О	Брашнеста мана *(Podosphaera spp.)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първи отворени цветове (първичен или А - цвят) - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	1-3	7	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	-
13	Броколи	П	Алтернариоза при зелевите (*Alternaria brassicae)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-55 (формиране на главите, ширина на нарастващия връх над 1 $см^3$- видими първите цветчета на централното стъбло (още затворени))	1-2	12	100 мл/дка	20-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	

14	Магданоз	П	Септориоза *(Septoria apii)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 41-46 (корените започват да нарастват (диаметър > 0.5 см) - 60% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1-2	14	100 мл/дка	20-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	
15	Целина	П	Септориоза *(Septoria apii)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 40-48 (нарастване на корените (диаметър над 0,5 см) - 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1-3	14	100 мл/дка	20-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	
16	Артишок	П	Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	ВВСН 40-55	1-2	10	100 мл/дка	30-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	7	

17	Лук (пресен, пролетен)	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука *(Puccinia allii)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават- листата са загинали. Върхът на луковицата е сух, латентност.)	1-2	14-21	100 мл/дка	30-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	7	
18	Чесън	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука *(Puccinia allii)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат е 50 % от очаквания диаметър на луковицата)	1-2	14-21	100 мл/дка	30-60	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	14	
19	Праз лук	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука *(Puccinia allii)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – растежа е завършил: дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта)	1-2	14	100 мл/дка	30-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	21	

20	Аспержи	П	Ръжда по аспержи *(Puccinia asparagi)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 41-89	1-2	14-21	100 мл/дка	30-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	-	
21	Грах	П	Аскохитоза *(Ascochyta pisi)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 59-77 (виждат се първите венчелистчета, но цветовете още са затворени – 70 % от шушулките са достигнали типична дължина; при натискане се отделя сок. Чупливост: 130 ТЕ)	1-2	14	100 мл/дка	30-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	7	
22	Малини	П	Брашнеста мана *(Podosphaera spp.)* Септориоза по малината *(Mycosphaerella navae)*	Листно приложение с конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (разтворени първи цветове – напълно узрели първи плодове)	1-3	7	100 мл/дка	50-100	А:20 гр/дка Б: 12,5 гр/дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели
(d) Напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за