РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1929

София, 23.08. 2021 г.

На основание чл. 57, чл. 60 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД -3005/18.08.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 5613/01.04.2020 г. и вх. № 10027/23.06.2020 г. от *Синджента България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 01299 - ПРЗ – Издание: 3/26.03.2020 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **(ПРЗ) ОРТИВА ТОП СК,** съдържащ активните вещества азоксистробин-200 г/л и дифеноконазол-125 г/л, с притежател на разрешението *Синджента България* ЕООД, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност" датата **„31.12.2021 г."** се заменя с **„31.12.2022 г.".**

Мотиви по т. 1.1:

Удължаване на срока на одобрението на активното вещество дифеноконазол до **31.12.2021 г.** с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1511 на Комисията от 16 октомври 2020 година.

1.2. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" се заменя с Приложение 1 на настоящата Заповед.

Мотиви по т. 1.2:

Със Заявление с вх. № 5613/01.04.2020 г. на БАБХ притежателят на РАЗРЕШЕНИЕ № 01299 - ПРЗ – Издание: 3/26.03.2020 г – *Синджента България* ЕООД заявява разрешаването на нови употреби по чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Заявените със Заявление с вх. № 5613/01.04.2020 г. нови употреби са оценени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад-оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 7307/05.04.2021 г.

1.3 Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" се заменя с Приложение 2 на настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3:

Със Заявление с вх. № 10027/23.06.2020 г. на БАБХ притежателят на РАЗРЕШЕНИЕ № 01299 - ПРЗ – Издание: 3/26.03.2020 г – *Синджента България* ЕООД заявява разрешаването на минимални употреби по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Заявените със Заявление с вх. № 10027/23.06.2020 г. минимални употреби са оценени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад-оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 7307/05.04.2021 г.

1.4 На страница 10 в частта *Особени изисквания и/или ограничения"* текстът: *„Компетентният орган не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от използването на ОРТИВА ТОП СК при минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или при фитотоксичност при употреба върху минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън е на лицето, прилагащо продукта.*
Употребата при минималните култури малина, броколи, целина, праз, лук, аспержи, грах, магданоз, артишок, лук и чесън да се означи отделно на етикета" да се заличи.

Мотиви по т. 1.4:

Информацията фигурира в **Забележки** след Приложение № 2 от настоящата заповед. Съгласно предоставената оценка от област биологична ефикасност на ПРЗ, с Писмо с вх. № 7307/05.04.2021 г. на БАБХ, при „прегледа на данни във връзка с новите заявени употреби показва, че има достатъчно подкрепящи данни, които позволяват ограничението включено в първоначално издаденото разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ОРТИВА ТОП СК по отношение на липса на ефикасност и фитотоксичност спрямо минималните култури: целина, праз, лук, чесън, грах, магданоз и артишок следва да отпадне."

1.5 На страница 10 в частта „Особени изисквания и/или ограничения" текстът: „Употребата при ягоди (в оранжерии) ще се счита разрешена съгласно предложената добра земеделска практика, когато бъдат ревизирани MRLs с Регламент 396/2005 г. Притежателят на разрешението е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган." да се заличи.

Мотиви по т. 1.5:

С Писмо с вх. 0 13709/17.06.2021 г. на БАБХ, притежателят на разрешението уведомява, че са ревизирани MRLs с Регламент (ЕО) 396/2005 г. за употребата при ягоди (в оранжерии).

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ ОРТИВА ТОП СК, етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 01299 - ПРЗ – Издание: 3/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Република България

ТС/РПРЗТ/ПРЗТК

Приложение № 1 за разрешенитеупотреби към Заповед № РД-11-1929/23.08.2022г.

Търговско наименование на продукта: ОРТИВА ТОП СК
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин* (200 г/л)
дифеноконазол** (125 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Слънчоглед	П	Сиви петна *(Diaporthe helianthi)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-55 (поява на цветен бутон между най-горните листа - бутонът е отделен от най-горните листа)	1	-	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	-	
2	Ориз	П	Пирикулария *(Pyricularia oryza)* Хелминтоспориоза (*Helmintho-sporium sp.*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 47 - 61 (влагалището на флаговия лист се разтваря - начало на цъфтеж)	1-2	15	80 -100 мл/дка	20-40 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	28 дни	

3	Зеле Карфиол	П	Алтернария по зелевите култури (*Alternaria brassicae)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 40 – 55 (главите започват формиране -видими първите единични цветчета/още затворени)	1-2	14	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	21 дни за зеле; 14 дни за карфиол	
4	Моркови	П	Листно гниене при моркови (*Alternaria dauci)* Брашнеста мана *(Erysiphe heraclei)* Септориоза *(Septoria apiicola)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН40 – 49 (корените започват да нарастват – нарастването на корена приключено)	1-3	14	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
5	Краставици Тиквички Корнишони	П	Брашнеста мана (*Erysiphae cichoracearum, Sphaerotheca fulginea*) Листна плесен *(Cladosporium cucumerinum)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)	1-3	10	100 мл/дка	50-100 л/дка 50-150 л/дка за корнишони	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
6	Пъпеш Диня	П/О	Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)* Краста *(Cladosporium cucumerinum)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение-пълна зрялост)	1-3	8	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	

7	Домати	П	Алтернария (*Alternaria spp.*) Брашнеста мана (*Leveillula taurica)* Листна плесен *(Cladosporium fulvum)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20 – 87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	1-3	7	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	7 дни	
8	Домати	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 16-87 (6 същински лист-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-3	8	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
9	Патладжан	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)* Алтернария *(Alternaria sp.)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20 – 87 (видима поява на първо връхно разклонение- 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	1-3	7	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	7 дни	
10	Патладжан	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 16-87 (6 същински лист-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-3	8	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	

11	Пипер	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 20 – 87 (видима поява на първо връхно разклонение- 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	1-2	10	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
12	Пипер	П	Алтернария *(Alternaria sp.)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)	1-2	10	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
13	Ягоди	О	Брашнеста мана (*Podosphaera spp.)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първи отворени цветове (първичен или А цвят) - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	1-3	7	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
14	Магданоз	П	Септориоза *(Septorii apii)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-46 (корените започват да нарастват - 60% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1-2	14	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	

			Алтернария *(Alternaria dauci)*		ВВСН 40-49 (корените започват да нарастват - край на нарастването на корена)		7		30-120 л/дка			
15	Целина	П	Септориоза (*Septoria apii*) Брашнеста мана *(Erysiphe heraclei)* Алтернария *(Alternaria daucii)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-48 (нарастване на корените – 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	1-3	14	100 мл/дка	20-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
16	Артишок	П	Брашнеста мана *(Erysiphae cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-55	1-3	10	100 мл/дка	30-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	7 дни	
17	Лук (пресен, пролетен)	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука (*Puccinia allii*)	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-растежът е завършил)	1-2	14-21	100 мл/дка	30-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	7 дни	
18	Чесън (пресен, пролетен)	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука (*Puccinia allii*)	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-достигнат е 50% от очевидния диаметър на луковицата)	1-2	14-21	100 мл/дка	30-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	

19	Чесън Лук Шалот (глави)	П	Пурпурни петна *(Alternaria porri)* Ръжда по лука *(Puccinia allii)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат е 50 % от очаквания диаметър на луковицата)	1	-	100 мл/дка	30-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
20	Праз	П	Пурпурни петна (*Alternaria porri)* Ръжда по лука (*Puccinia allii*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 40 - 49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-растежът е завършил)	1-2	14	100 мл/дка	30-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	21 дни	
21	Аспержи	П	Ръжда по аспержи (*Puccinia asparagi)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 41 - 89	1-2	14-21	100 мл/дка	30-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	-	
22	Грах	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 59-77 (виждат се първите венчелистчета, но цветовете още са затворени - 70% от шушулките са достигнали типична дължина)	1-2	14	100 мл/дка	30-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	7 дни	

23	Малини	П	Брашнеста мана (*Podosphaera)* Септориоза по малината (*Mycosphaerella navae)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (разтворени първи цветове-напълно узрели първи плодове)	1-3	7	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
24	Пащърнак	П	Алтернария *(Alternaria dauci)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (корените започват да нарастват - нарастването на корена приключено)	1-3	14	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
25	Копър	П	Алтернария *(Alternaria dauci)* Септориоза *(Septoria apiicola)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-48	1-2	10	100 мл/дка	20-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
26	Тикви	П	Листна плесен *(Cladosporium cucumerinum)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-89 (поява на първо странично разклонение-пълна зрялост)	1-3	8	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	3 дни	
27	Марули	П	Алтернария *(Alternaria brassicae)* Церкоспороза *(Cercospora sp.)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (образувана 10% от листната маса - формирана е цялата листна маса)	1-2	7	100 мл/дка	30-120 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	

28	Ескариол (широколистна ендивия) Спанак Рукола	П	Церкоспороза *(Cercospora sp.)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 40-49 (образувана 10% от листната маса - формирана е цялата листна маса)	1-2	7	100 мл/дка	30-120 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1929/23.08.2022г.

Търговско наименование на продукта: ОРТИВА ТОП СК
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин* (200 г/л)
дифеноконазол** (125 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Нахут	П	Аскохитоза *(Ascochyta pisi)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 59-77 (виждат се първите венчелистчета, но цветовете още са затворени – 70 % от шушулките са достигнали типична дължина)	1-2	7	100 мл/дка	30-100 л/дка	20*+ 12.5**	14 дни	

2	Броколи	П	Алтернария при зелевите (*Alternaria brassicae)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-55 (формиране на главите – видими първите цветчета на централното стъбло (още затворени)	1-2	12	100 мл/дка	20-60 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
3	Аспержи	П	Ръжда по аспержи (*Puccinia asparagi)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 41 - 89	1-2	14-21	100 мл/дка	30-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	-	
4	Червено цвекло Хрян Земна ябълка Магданоз на грудки Коза брада Репички Репи	П	Алтернария *(Alternaria dauci)* Брашнеста мана *(Erysiphe heraclei)* Септориоза *(Septoria apiicola)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40-49	1-3	14	100 мл/дка	20-60 мл/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	14 дни	
5	Малини	П	Петносване по пъпките *(Didymella applanata)*	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 40 79	1-2	7	75-100 мл/дка	50-100 л/дка	15 а.в./дка* + 9.38 г а.в./дка** 20 а.в./дка *+ 12,5 г/дка**	7 дни	
6	Маслодайна роза	П	Ръжда (*Phragminium mucoronatum*) Черни листни петна (*Diaolocarpon rosae*)	Конвен ционална наземна техника	При поява	1-3	10	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	-	Да се спазва Законът за пчеларството

7	Лавандула	П	Септориоза (*Septoria lavandulae*)	Конвенционална наземна техника	При поява	1-3	10	100 мл/дка	50-100 л/дка	20 г/дка* 12,5 г/дка**	-	Да се спазва Законът за пчеларството

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ОРТИВА ТОП СК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ОРТИВА ТОП СК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.
3. Употребите при минималните култури в Приложение № 2 да се вписват отделно на етикета.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения